

Орнитоз - инфекционное заболевание человека, которое передается от птиц и характеризуется поражением легких (пневмонии). Заболевание может протекать в острой, хронической и стертой формах.

Возбудитель орнитоза - хламидия, особый вид микроорганизма, который по своим свойствам близок к вирусам. Хламидии, проникая в организм человека или животного, развиваются внутри клеток, чаще всего поражаются легкие.

Симптомы заболевания орнитозом у человека: Заражение человека орнитозом происходит при контакте с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Период от момента заражения до появления первых признаков заболевания может длиться в среднем 6-10 дней, реже до 20 дней. Человек может заразиться орнитозом:

- воздушно-пылевым (аэрозольным) путем при вдыхании инфицированного воздуха (пыли, пуха);
- контактным, через поврежденные слизистые оболочки и кожные покровы;
- при употреблении загрязненных пищевых продуктов.

Возможность передачи орнитоза от человека к человеку мало вероятна, но нельзя исключить передачу инфекции при тесном контакте с больным через мокроту при кашле. Основными клиническими признаками орнитоза у человека являются первичное поражение легких и общая интоксикация. Клиническая картина характеризуется острым началом, подъемом температуры тела до 38 градусов, головной и мышечной болью, катаральными явлениями и развитием пневмонии. В начале заболевания для орнитозной пневмонии характерен сухой кашель без мокроты, а затем при присоединении вторичной бактериальной инфекции появляется гнойная мокрота. В ряде случаев без своевременно начатого специфического лечения лихорадящее состояние может продолжаться 2-3 недели, орнитозная пневмония может приобретать хронические формы и давать рецидивы. При правильном и своевременном лечении наступает выздоровление. Перенесенное заболевание не создает напряженного иммунитета и не предохраняет от повторного заражения. В ряде случаев повторное заражение орнитозом происходило спустя 1-2 года после перенесенного ранее заболевания. Восприимчивость людей к орнитозу очень велика. Заболеваемость орнитозом среди населения характеризуется единичными спорадическими и групповыми семейными или профессиональными случаями заболеваний.

Основными источниками заражения орнитозом на территории города являются декоративные комнатные птицы, бесхозные голуби, а также дикие птицы в природных условиях (турпоходы, отдых на даче). Очаги заболеваний

семейного характера (по 2 случая) связаны с содержанием в домашних условиях декоративных птиц (попугаев), купленных в зоомагазинах города.

Чтобы уберечь себя и своих близких от возможного заражения орнитозом, соблюдайте простые **правила**:

- нельзя близко контактировать с дикими птицами, а также подбирать больных и раненых;

- не прикармливайте на своих окнах, верандах или балконах голубей и воробьев;

- опасайтесь голубиного помёта (и земля, которая может быть им загрязнена) не менее, чем самих птиц.

- избегайте приобретения декоративных, певчих и других птиц без соответствующего документа ветеринарной службы, удостоверяющего состояние их здоровья;

- после общения (даже относительно дистанционного) с голубями, тщательно вымойте руки себе и ребёнку;

- птицу необходимо приобретать в отведенных местах торговли с ветеринарными сопроводительными документами;

- при покупке птиц вы вправе узнать о благополучии местности по данному заболеванию и проводились ли исследования на орнитоз, что указано в ветеринарных сопроводительных документах;

