

- мокрые волосы накрывают полиэтиленовой салфеткой и повязывают голову косынкой на 20-30 мин. (при использовании лосьона «Миттифор» - до 40 мин.);

- после этого голову моют теплой водой с хозяйственным мылом, тщательно вычесывают волосы частым гребнем с ватой, смоченной 8% р-ром столового уксуса, на бумагу или клеенку,
- прополаскивают волосы чистой водой;
- бумагу или клеенку, на которую вычесывают волосы – сжигают.


При обнаружении гнид на волосистой части головы проводят дополнительные мероприятия:

- подогревают столовый уксус до 27-30°С;
- ватой, смоченной в уксусе обрабатывают пряди волос;
- повязывают голову косынкой на 15-20 мин.;
- тщательно вычесывают волосы частым гребнем;
- моют голову.

При необходимости, для полной ликвидации педикулеза, проводится повторная обработка волос.

**Сыпной тиф - болезнь,
которая не должна возвращаться!**

Вошь головная



Самец

Яйцо
(гнида)

Самка

Осторожно,


ПЕДИКУЛЕЗ!



ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская
городская поликлиника»
Кабинет медицинской профилактики

Уважаемые родители, внимание! В школах г. Южно-Сахалинска регистрируются случаи педикулеза!

Возбудитель педикулеза – головная вошь. Живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке, темени.



Вошь головная
Самец Яйцо Самка
(гнида)

Продолжительность жизни взрослых особей 27-30 дней. За всю жизнь самка откладывает до 120 яиц (гнид).

Головная вошь – основной переносчик сыпного тифа. Там, где есть вши-реальной становится опасность сыпного тифа.


Все вши – кровососы. Напившись крови, зараженной возбудителем сыпного тифа, они передают заболевание от больного – к здоровому.

Почему педикулез в эпоху цивилизации?

Ведь население города имеет все для предупреждения завшивленности – полноценное питание, воду, электричество, уют...

Профилактика педикулеза – это не что иное, как соблюдение правил личной гигиены:

- регулярный прием душа; посещение бань, саун и т.д.;
- мытье головы и тела горячей водой с мылом, шампунем;



- еженедельная смена постельного белья, регулярная смена нательного белья, гладка горячим утюгом;
- привитие детям в семье гигиенических навыков;
- полный запрет на использование чужого белья, одежды, головных уборов, предметов личной гигиены (расчесок);

- контроль за состоянием головы, чистотой белья и одежды детей и подростков.



Методика обработки ребенка при педикулезе:

- ребенка, не раздевая, усаживают на стул, покрытый пеленкой или клеенкой;

- м а т ь о д е в а е т дополнительные халяг, косынку;

- волосы либо остригают, либо обрабатывают одним из инсектицидных растворов:

* 20% водно-мыльной суспензии бензилбензоата – 30 мл.;

* лосьоном «Ниттифор» - 50-60 мл.;

* 10% водной мыльно-керосиновой эмульсией – 10 мл.;

* шампунем «Гринцид»;

