

При нарастании размеров папулы ребенок направляется на консультацию к фтизиатру.

В течение месяца ребенок должен пройти осмотр фтизиатра и назначенное необходимое обследование.

Ребенок допускается в организованный коллектив со справкой от фтизиатра. Если в течение месяца заключение фтизиатра отсутствует, ребенок отстраняется от посещения организованного коллектива.



### **Уважаемые родители, помните!**

**Ежегодная проба Манту  
обеспечит раннее выявление  
заболевания туберкулезом.  
Будьте благоразумны!**



ГБУЗ "Областная детская больница"  
Кабинет медицинской профилактики

Проба «Манту» - Не прививка!

**Это основной метод  
профилактического  
обследования детей  
на туберкулез.**

24 марта в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии возбудителя туберкулеза - страшной болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас.

В настоящее время треть мирового населения инфицирована туберкулезом. Туберкулезом болеют люди разного возраста, пола, национальности. Палочка Коха не различает социального статуса, и с одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых, взрослых и детей...



**Туберкулинодиагностика (проба Манту) – это специфический тест на туберкулез.**

**Целью массовой туберкулинодиагностики является:**

- \* **Выявление лиц, впервые инфицированных туберкулезом;**
- \* **Ранняя диагностика туберкулеза у детей и подростков;**
- \* **Отбор контингентов для прививок вакциной БЦЖ.**

Для массовой туберкулинодиагностики применяется только внутркожная проба с двумя туберкулиновыми единицами (проба Манту), которая абсолютно безвредна, как для здоровых детей и подростков, так и для лиц с соматическими заболеваниями.

Реакция Манту проводится здоровым детям раз в год; детям из «группы риска», а также детям, не имеющим вакцинацию БЦЖ в периоде новорожденности — 2 раза в год. Проба Манту ставится на внутреннюю поверхность предплечья, внутркожно, после нее на коже появляется белая «пуговка».

#### **Внимание!**

Материал, используемый для пробы Манту, не содержит микобактерий туберкулеза, а только продукты их жизнедеятельности. Аллерген, входящий в их состав способен вызвать при внутркожной пробе специфическую реакцию у лиц, которые инфицированы туберкулезом.

**Результаты пробы оцениваются через 72 часа.** Проба Манту считается положительной при нарастании ее показателей (размеров папулы).

**Противопоказаниями для постановки пробы Манту в период массовой туберкулинодиагностики являются:**

- \* **кожные заболевания;**
- \* **острые и хронические инфекционные и соматические заболевания в период обострения.**

**Запрещено проводить туберкулинодиагностику, если в детском коллективе объявлен карантин по инфекционным заболеваниям.**

Ежегодному обследованию с помощью внутркожной пробы Манту подлежат практически здоровые дети и подростки, начиная с 12-месячного возраста, независимо от результатов предыдущей пробы, до 17 лет.


#### **Уход за «пуговкой»:**

После введения туберкулина образуется специфическое выбухание верхнего слоя кожи более известное как «пуговка».

#### **Уважаемые родители!**

Неправильное обращение с местом постановки пробы может повлиять на результат реакции. До момента оценки результатов (до 72 часов) нельзя мазать «пуговку» зеленкой, перекисью водорода. Очень важно не допускать контакта места пробы с водой и другими жидкостями. Не нужно заклеивать «пуговку» лейкопластырем — под ним кожа может потеть. Не допускайте того, чтобы ребенок расчесывал место введения туберкулина. После оценки результатов, если образовался гнойничок или язвочка, ее можно обрабатывать. Как любую другую ранку, с применением всех традиционных средств.

Во избежание ложноположительных показателей пробы Манту, просим родителей ограничить прием детьми сладостей; продуктов питания, вызывающих аллергические проявления (апельсины, мандарины, шоколад, красные яблоки, рыбные деликатесы и т.д.) накануне пробы и вплоть до прочтения ее результатов.



Остается добавить, что положительная реакция Манту еще не означает, что ребенок определенно заболел туберкулезом. Раньше времени родителям не стоит поднимать панику. Этот диагноз может поставить только врач-фтизиатр после тщательного обследования, в ходе которого берутся анализы, делается рентгенография. Проба Манту в данном случае будет являться сигналом, что такое обследование необходимо провести.